
CARLETTI






NOME COMUNE	**Silene, Schioppettino**
NOME SCIENTIFICO	*Silene vulgaris (Moench) Garcke*
FAMIGLIA	Caryophyllaceae
ORIGINE	Europa, Asia temperata e Nord Africa; naturalizzata in gran parte del Nord America e in altre regioni temperate del mondo.
DESCRIZIONE BOTANICA	
• **portamento:**	Pianta erbacea perenne, glabra o leggermente glauca, con fusti eretti o ascendenti, generalmente alti 20–60 cm (talvolta fino a 80 cm), provvista di rizoma.
• **foglie:**	Opposte, semplici, lanceolate o ovato-lanceolate, di colore verde-glauco, margine intero, sessili o brevemente picciolate nelle foglie basali.
• **fiori:**	Riuniti in infiorescenze lasse. Calice molto caratteristico, rigonfio e reticolato, verde con sfumature violacee; corolla composta da cinque petali bianchi profondamente bifidi. Fiori ermafroditi, impollinati principalmente da insetti.
ESPOSIZIONE	Preferisce il pieno sole, ma cresce bene anche in mezz'ombra. Tollera terreni poveri, sassosi e calcarei, purché ben drenati.
SEMINA	In primavera (marzo–maggio) oppure in autunno (settembre–ottobre) direttamente a dimora o in semenzaio. I semi germinano in 2–4 settimane con temperature di circa 15–20 °C.
FIORITURA	Da maggio a settembre, con variazioni legate all'altitudine e al clima.
FRUTTO	Capsula ovoidale che, a maturità, si apre nella parte superiore mediante denti apicali liberando numerosi piccoli semi reniformi di colore bruno.
RACCOLTA DEL SEME	Da luglio a ottobre, quando le capsule sono completamente secche ma non ancora aperte spontaneamente.

Fonti

1. Plants of the World Online (Royal Botanic Gardens, Kew) – Silene vulgaris (Moench) Garcke.

2. Flora d'Italia – Sandro Pignatti, Edagricole (2ª ed.; aggiornamenti online).

3. Acta Plantarum – Flora Italiana: scheda botanica di Silene vulgaris.

4. Euro+Med PlantBase – Silene vulgaris.

5. Missouri Botanical Garden – Plant Finder e documentazione botanica del Missouri Botanical Garden.

Altro

PER USO ALIMENTARE: Si consumano sia crudi (le foglie più giovani) sia, più frequentemente, cotti dopo una breve sbollentatura di 2–5 minuti.

Crediti

https://bs.plantnet.org/image/o/f1811116114d3dddc7a97f9db1e96adefed78406

https://bs.plantnet.org/image/o/7c46806ba97e9882927edc168cc2adf210c53bc5

https://bs.plantnet.org/image/o/f278ba7ca0c6394654e4f067a05d942c7319f045

https://bs.plantnet.org/image/o/e4d71be5653327fc946e60bfdabe78b7cac1946b