# MUSCARI






| | |
|---|---|
| **NOME COMUNE** | **Muscari, Muscari negletto** |
| **NOME SCIENTIFICO** | *Muscari neglectum* |
| **FAMIGLIA** | Asparagaceae |
| **ORIGINE** | Europa centrale e meridionale, area mediterranea e Asia occidentale e centrale. È una specie nativa di un vasto territorio che comprende l'Italia, i Balcani, la Penisola Iberica, il Nord Africa, il Medio Oriente, il Caucaso e alcune regioni dell'Asia centrale. |
| **DESCRIZIONE BOTANICA** | |
| • **portamento:** | Piccola pianta erbacea perenne e bulbosa, geofita, alta generalmente 10–30 cm. Dal bulbo sotterraneo emerge uno scapo fiorale eretto e privo di foglie, terminante con una densa infiorescenza a grappolo. |
| • **foglie:** | Basali, numerose in genere 3–6, lineari o nastriformi, strette, lunghe circa 5–35 cm e larghe pochi millimetri. Sono verdi, scanalate e spesso arcuate o ricadenti, soprattutto durante la fioritura. Compaiono generalmente già durante l'autunno o l'inverno e persistono fino alla primavera. |
| • **fiori:** | Riuniti in una densa infiorescenza ovale o cilindrico-conica lunga generalmente 2–6 cm. I fiori fertili sono piccoli, campanulati o urceolati, di colore blu scuro, blu-violaceo fino al blu nerastro, spesso con un caratteristico margine biancastro. I fiori posti nella parte superiore dell'infiorescenza sono generalmente più chiari e sterili. Sono delicatamente profumati, con aroma dolce e muschiato. |
| **ESPOSIZIONE** | Pieno sole o mezz'ombra luminosa. Predilige ambienti aperti, prati, incolti e terreni ben drenati. Sopporta bene i terreni relativamente asciutti durante il periodo estivo. |
| **SEMINA** | La propagazione può avvenire per seme, generalmente dopo la maturazione estiva dei frutti. I semi vengono distribuiti su substrato leggero e ben drenato e mantenuti umidi. La specie si moltiplica molto efficacemente anche attraverso i bulbi e i bulbilli, che costituiscono il metodo più semplice e rapido di propagazione. |
| **FIORITURA** | Da marzo a giugno, con possibile inizio già a febbraio nelle zone a clima mite. Il periodo più tipico è marzo-aprile. |
| **FRUTTO** | Capsula secca a tre valve, generalmente di forma ovata, globosa o leggermente angolosa, che a maturità si apre liberando i semi. Le capsule mature assumono una colorazione brunastra. |
| **RACCOLTA DEL SEME** | Fine primavera–estate, generalmente giugno-luglio, quando le capsule sono completamente mature e secche. I semi sono piccoli, neri, globosi o leggermente angolosi, con superficie da finemente rugosa a reticolata. |

Fonti

Royal Botanic Gardens, Kew – Plants of the World Online

Portale della Flora d'Italia – Università di Trieste

Flora of North America

Anthosart – Flora Italiana

Acta Plantarum

| | |
|---|---|
| Altro | Non è consigliabile usare il bulbo come alimento. Il noto LAMPASCIONE è il bulbo di un diverso MUSCARI, il "comosum". |

Crediti

https://bs.plantnet.org/image/o/dd397498b0077a6d668ca9f3b4f725d4261f2d6a

https://bs.plantnet.org/image/o/9e6778409eb587f0838fcfc6d8e8d7fdd4b65248

https://bs.plantnet.org/image/o/6fb01932965e9b9b39e7a3e725a4fd71686d4a16

https://bs.plantnet.org/image/o/7fed2d36cf4905bd989c60ef698a57f5d29e4b2a