SCABIOSA MACEDONE






NOME COMUNE	**Scabiosa macedone, Knautia cremisi**
NOME SCIENTIFICO	*Knautia macedonica*
FAMIGLIA	Caprifoliaceae (sottofamiglia Dipsacoideae)
ORIGINE	Europa sud-orientale: area balcanica (Macedonia)
DESCRIZIONE BOTANICA	
• **portamento:**	Pianta erbacea perenne, cespitosa e piuttosto ariosa, con fusti eretti, sottili e ramificati, generalmente alti circa 60–80 cm, occasionalmente fino a circa 1 m. Può avere una durata relativamente breve, ma tende ad autoriseminarsi.
• **foglie:**	Foglie basali riunite in rosetta, verde scuro, generalmente profondamente lobate o pennatifide; quelle del fusto sono opposte, più piccole e da intere a lobate. Possono presentare una leggera peluria.
• **fiori:**	Capolini globosi, simili a piccoli puntaspilli, di circa 3–4 cm di diametro, portati all'estremità dei fusti. Il colore tipico è rosso cremisi o rosso vino, con possibilità di tonalità rosa, porpora o lilla nelle forme coltivate. Molto attrattivi per api, farfalle e altri insetti impollinatori.
ESPOSIZIONE	Pieno sole. Predilige terreni fertili o moderatamente fertili, ben drenati, neutri o preferibilmente calcarei/alcalini. Tollera periodi di siccità una volta ben affrancata.
SEMINA	Si può seminare in primavera, indicativamente marzo–maggio, oppure in autunno. I semi possono avere una germinazione irregolare e beneficiare di un periodo di freddo-umido; per la semina primaverile può essere utile una breve stratificazione fredda.
FIORITURA	Generalmente da giugno/luglio a settembre, con fioritura prolungata e produzione successiva di nuovi capolini durante l'estate. In condizioni favorevoli può protrarsi fino all'inizio dell'autunno.
FRUTTO	Frutto secco del tipo achenio, piccolo e inizialmente verde, che diventa progressivamente brunastro a maturazione. Rimane associato al capolino e può contribuire alla disseminazione spontanea della pianta.
RACCOLTA DEL SEME	Agosto–ottobre, generalmente quando la fioritura è terminata e i capolini iniziano a seccarsi. È opportuno raccogliere i capolini maturi quando gli acheni hanno assunto una colorazione bruno-beige e risultano asciutti. I semi sono piccoli, allungati e asciutti, di colore generalmente bruno, contenuti nei capolini secchi. Lasciare asciugare ulteriormente i capolini in luogo ventilato prima di separare e conservare il seme.

Fonti

Cambridge University Botanic Garden – Knautia macedonica

Kwantlen Polytechnic University – Plant Database, Knautia macedonica

Jelitto – Knautia macedonica Seed Information

Chiltern Seeds – Knautia macedonica

Promesse de Fleurs – Knautia macedonica

Altro

Pianta ornamentale per aiuole, bordure, giardini informali e naturali, prati fioriti e giardini per insetti impollinatori. È particolarmente adatta anche alla coltivazione in gruppi e come fiore da recidere. I capolini attirano api, farfalle e altri impollinatori; i fusti leggeri e i fiori dai colori intensi sono adatti a composizioni floreali.

Crediti

https://bs.plantnet.org/image/o/8c90f7c81555711c0eb009fc8a312c9d145b2867

https://bs.plantnet.org/image/o/69b235ea60b3ccd65f6bc80ea70b9091d3ad7ce0

https://bs.plantnet.org/image/o/5de2d7b00246b0c1f068c0e8f008378994b7c088

https://bs.plantnet.org/image/o/6b10ed0319eba81da014c4583cb1169dee33e862